

レジメン名	Per+Tras(皮下)
がん種	乳癌、大腸癌

一般名	投与量	単位	
ペルツズマブ	(初回量)	1200	mg/body
	(維持量)	600	mg/body
トラスツズマブ	600	mg/body	

3週で1クール      3週ごとに維持量を投与

day 1    ...    21    22    ...    42    43    ...    63


1クール      2クール      3クール

### 治療内容

経過時間

メイン	側管
-----	----

経過時間



#### ※ フェスゴの皮下注射方法 ※

- 大腿部に皮下投与する(腹部など大腿部以外への投与は不可)。
- 【IN製剤 : 初回投与時】 8分以上かけて  
【MA製剤 : 2回目以降】 5分以上かけて
- 原則として、左右の大腿部に交互に投与すること。  
(困難な場合は、前回の注射部位から2.5cm以上離すこと)
- フェスゴ以外の薬剤を皮下注射する場合は、大腿部以外に投与する。
- 傷、発疹、発赤、硬結など皮膚に異常のある部位を避けて投与する。
- シリンジへの採取から4時間以内に投与を終了する。  
(冷所保管の場合は24時間以内 → 室温に戻してから投与)
- 初回投与終了後、少なくとも30分間は経過観察を行うこと。  
(忍容性が良好であれば、2回目以降は15分まで短縮可能)