レジメン名　**GCD**

がん種　**悪性リンパ腫**

一般名	投与量	単位
ゲムシタビン	1,000	mg/㎡
カルボプラチン	5	AUC
デキサメタゾン	40	mg/日



治療内容（day1）

メイン　側管

ルート確保用輸液は、所要時間に合わせて適宜速度調節する。

ソリタT1(200ml)

デキサメタゾン1回20mgを朝、夕に服用。
治療前に服薬確認。

針先が、抗癌剤を含まない輸液に満たされた後、抜針する。

ルート確保

経過時間

0　30分　ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾊﾞｯｸﾞ(100ml)
アロカリス

:30　全開滴下　生食(50ml)

1　30分 ⓘ　ジェムザール
生食(100ml)

ⓘ　1時間　カルボプラチン
生食(250ml)

2

:30

ジェムザールは溶解後のpHが約3と酸性寄りであり、患者様が血管刺激症状を訴えられることがあります。以下のような予防・緩和策が考えられます。

1. 穿刺にはなるべく太い血管を選ぶ
2. 穿刺部位より上流側を温めて、血管を拡張させる
3. ジェムザールの投与中はソリタの投与速度を速めて血管内のジェムザールが薄まるようにする

5

:30

6

レジメン名	GCD（day8）
がん種	悪性リンパ腫

一般名	投与量	単位
ゲムシタビン	1,000	mg/㎡
カルボプラチン	5	AUC
デキサメタゾン	40	mg/日



治療内容（day8）

ルート確保用輸液は、所要時間に合わせて適宜速度調節する。

経過時間	メイン	側管
0	ソリタT1(200ml) ルート確保	30分 デキサート(3.3mg/ml)　2A 生食(100ml)
:30		30分 ⓘ ジェムザール 生食(100ml)
1		
:30		
2		
:30		
5		
:30		
6		

針先が、抗癌剤を含まない輸液に満たされた後、抜針する。

ジェムザールは溶解後のpHが約3と酸性寄りであり、患者様が血管刺激症状を訴えられることがあります。以下のような予防・緩和策が考えられます。

1. 穿刺にはなるべく太い血管を選ぶ
2. 穿刺部位より上流側を温めて、血管を拡張させる
3. ジェムザールの投与中はソリタの投与速度を速めて血管内のジェムザールが薄まるようにする