

レジメン名	GDP (day8)		
がん種	悪性リンパ腫		
一般名	投与量	単位	
ゲムシタビン	1,000	mg/m ²	↓
シスプラチン	75	mg/m ²	↓
デキサメタゾン	40	mg/日	↓

3週で1クール

デキサメタゾンは4日間

day 1 ... 8 ... 15 ... 22 ... 29 ... 36 ... 43 ...

1クール 2クール

治療内容 (day8)																													
メイン	側管																												
<p>ルート確保用輸液は、所要時間に合わせて適宜速度調節する。</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">ソリタT1(200ml)</p> <p>ルート確保</p> <p>針先が、抗癌剤を含まない輸液に満たされた後、抜針する。</p> 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">経過時間</th> <th style="width: 50%;"></th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="background-color: #ADD8E6;">30分</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">:30</td> <td style="background-color: #ADD8E6;">30分 ①</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">:30</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">:30</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">:30</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">:30</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">:30</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td></td> </tr> </table> <p style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">デキサート(3.3mg/1ml) 2A 生食(100ml)</p> <p style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;">ジェムザール 生食(100ml)</p>	経過時間		0	30分	:30	30分 ①	1		:30		2		:30		3		:30		4		:30		5		:30		6	
経過時間																													
0	30分																												
:30	30分 ①																												
1																													
:30																													
2																													
:30																													
3																													
:30																													
4																													
:30																													
5																													
:30																													
6																													

ジェムザールは溶解後のpHが約3と酸性寄りであり、患者様が血管刺激症状を訴えられることがあります。以下のような予防・緩和策が考えられます。

1. 穿刺にはなるべく太い血管を選ぶ
2. 穿刺部位より上流側を温めて、血管を拡張させる
3. ジェムザールの投与中はソリタの投与速度を速めて血管内のジェムザールが薄まるようにする

