

レジメン名	THP-COP(外来)
がん種	悪性リンパ腫

一般名	投与量	単位
ビンクリスチン	1	mg/m ²
ピラルピシン	30	mg/m ²
シクロホスファミド	500	mg/m ²
プレドニゾン(内服)	30	mg/体


21日で1コース

5日間内服

day	1	2	3	4	5	6	...	21	22	23	24	25	26	...
	1	2	3	4	5	6	...	21	22	23	24	25	26	...

リツキシマブとの併用療法では、day1にリツキシマブ、day2に化学療法となる

治療内容		経過時間	側管
メイン			
7%メイロン(20ml) 1A プリンペラン 1A ソリタT3(200ml)	30分	0	
ラモセトロン 1V 生食(50ml)	全開滴下	:30	5%ブドウ糖(100ml) 必要時
オンコビン 生食(50ml)	全開滴下 (V)	1	
ピノルピン 5%ブドウ糖(100ml)	1時間 (V)	:30	
エンドキサン 生食(500ml)	2時間 (i)	2	
		:30	
		3	
		:30	
		4	
ラモセトロン 1V 生食(50ml)	全開滴下	:30	
	30分	5	
7%メイロン(20ml) 1A プリンペラン 1A ソリタT3(200ml)		:30	
		6	
		:30	
		7	



抗癌剤投与中にトイレ移動する場合は、側管からブドウ糖(100ml)をつなぎ、メインルートを押めて下さい。
(血管外漏出対策)

