| レジメン名 | BV+AVD（A+AVD） |
|---|---|
| がん種 | ホジキンリンパ腫 |

| 一般名 | 投与量 | 単位 |
|---|---|---|
| ビンブラスチン | 6 | mg/㎡ |
| ドキソルビシン | 25 | mg/㎡ |
| ダカルバジン | 375 | mg/㎡ |
| ブレンツキシマブベドチン | 1.2 | mg/kg |

2週間隔で投与、28日で1コース

day 1 ・・・ 8 ・・・ 15 ・・・ 22 ・・・ 29 ・・・ 36 ・・・

1コース　2コース

## 治療内容

ルート確保用輸液は、所要時間に合わせて適宜速度調節する。
治療薬の投与中は中止可。
残破棄可。

生食（500ml）

★ 注意 ★

ダカルバジン投与中は、専用の遮光袋を使用して点滴ルートを遮光する

最後は、針先が抗癌剤を含まない輸液に

| 経過時間 | メイン | 側管 | |
|---|---|---|---|
| 0 | ルート確保 | 30分 | パロノセトロン バッグ<br>アロカリス 1V<br>デキサート 3A |
| :30 | | 全開 ⓥ | エクザール<br>生食（50ml） |
| 1 | | 30分 ⓥ | アドリアシン<br>生食（100ml） |
| :30 | | ⓘ 1時間 | ダカルバジン<br>生食（500ml） |
| 2 | | 全開 | 生食（50ml） 全開フラッシュ |
| :30 | | 30分 ⓝ | アドセトリス<br>生食（100ml） |
| 3 | | 等速 | 生食（50ml） 等速フラッシュ |
| :30 | | | |
| 4 | | | |
| :30 | | | |
| 5 | | | |
| :30 | | | |
| 6 | | | |
| :30 | | | |