レジメン名	プララトレキサート
がん種	末梢性T細胞リンパ腫

一般名	投与量	単位
VB12	1000	μg/回
葉酸	1.0～1.25	mg/日
プララトレキサート	30	mg/㎡

8～10週ごと　8～10週ごと

週	前	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

週1回、6週連続で投与し、1週間休薬。1コース7週間。

治療内容

ルート確保用輸液は、所要時間に合わせて適宜速度調節する。
治療薬の投与中は中止可。
残破棄可。

メイン	経過時間	側管
生食（100ml） ルート確保	0	30分
	:30	全開滴下 ⓝ
		全開滴下
	1	
	:30	
	2	
	:30	
	3	
	:30	
	4	
	:30	
	:30	
	7	

（省略可）
デキサート（3.3mg/ml）2A
生食（50ml）

ジフォルタ
生食（50 ml）

生食（50ml）
フラッシュ用

針先が、抗癌剤を含まない輸液に満たされた後、抜針する。

葉酸1.0mg/dayは、パンビタン末　2g/dayに相当する。
ジフォルタ投与開始10日以上前から投与終了30日後まで、
上記相当量を連日内服する。

ビタミンB12　1,000μgは、メチコバール注（500μg）　2Aに相当する。
ジフォルタ投与開始10日以上前から投与終了時まで、
上記相当量を8～10週間隔で筋肉内注射する。