

レジメン名	ベンダムスチン(90)(外来)
がん種	悪性リンパ腫

一般名	投与量	単位
リツキシマブ	375 mg/m ²	
(又は、オビヌツズマブ)	1,000 mg/体	
ベンダムスチン	90 mg/m ²	

オビヌツズマブ
1コース目は
day8, 15あり

28日で1コース

day 1 2 3 4 ... 30 29 30 31 32 ... 56

1コース 2コース

day1の治療内容は
該当レジメンを参照

治療内容(day2,3)		
メイン		側管
	経過時間	
	0	
ソリタT3(200ml) 7%メイロン 1A	30分	ラモセトロン 1A デキサート(3.3mg/ml) 3A 生食(50ml)
生食(250ml)	1時間	① 1時間 (遮光)
	:30	トレアキシシ 生食(250ml)
ソリタT3(200ml) 7%メイロン 1A	30分	
	2	
	:30	
	3	

全開滴下

トレアキシシは調製から
3時間以内に投与を終える。



◎トレアキシシ調製後の輸液はpH3~4となり、血管刺激症状を起こす可能性がある。

【対策】

- ・なるべく太い血管を選び穿刺する。
- ・穿刺部位より上流側を温めて血管を拡張させる。
- ・別の輸液の側管投与とすることで、血管内の薬物濃度を薄める。

◎トレアキシシは溶解後徐々に加水分解する。

(生理食塩水のみとの配合変化の情報がある)

【対策】

- ・調製から3時間以内に投与を完了する。
 - ・メイロン入りソリタT3(pH7.5程度)は腫瘍崩壊症候群の予防上必須である。
- トレアキシシとの配合変化情報がないためルート内での配合を避ける。

