レジメン名	mFOLFOX6＋ニボルマブ
がん種	胃癌

一般名	投与量	単位
ニボルマブ	240	mg/body
レボホリナート	200	mg/㎡
オキサリプラチン	85	mg/㎡
5-FU(急速)	400	mg/㎡
5-FU(持続)	2,400	mg/㎡

2週ごとに投与

(46hrs)

day	1	2	3	・・・	8	・・・	15	16	17	・・・	22	・・・	29	30

2週　2週

治療内容

メイン　側管

CVポートより投与する

経過時間

生食(100ml)

ルート確保

30分

デキサート(3.3mg/1ml) 2A
グラニセトロンバッグ(100ml)

オキサリプラチン
5%ブドウ糖(250ml)
(レボホリナートと同時開始)

ⓘ

2時間

15分 ⓘ

ⓘ

フルオロウラシル
生食(100ml)
オキサリプラチン終了後

フルオロウラシル
生食(適宜)/規定薬液量

フルオロウラシル全開投与後
加圧式注入器で投与
(入院では1000mlの生食に
希釈して持続点滴する)

46時間

0　:30　1　:30　2　:30　3　:30　4　:30　5　:30

30分 ⓝ

オプジーボ
生食(100ml)
0.2μmまたは0.22μmの
フィルターを使用する

等速

生食(50ml) 等速フラッシュ

レボホリナート
5%ブドウ糖(250ml)

2時間