

レジメン名
がん種

トラスツズマブ+SOX
胃癌

一般名	投与量	単位
トラスツズマブ	(初回量) 8 mg/kg (維持量) 6 mg/kg	
オキサリプラチン	130 mg/m ²	
S-1(内服)	80 mg/m ² /日	day

3週ごと	
2週服薬	休薬
1 ... 8 ... 15 ... 22 ... 29 ... 36 ...	1コース 2コース

	治療内容	
	メイン	側管
<p>ルート確保用輸液は、所要時間に合わせて適宜速度調節する。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>生食(250ml)</p> <p>ハーセプチン後の生食フラッシュ終了時に残液を破棄し、ブドウ糖液に切り替える。</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>5%ブドウ糖(250ml)</p> <p>day1の夕食後からエスワン服用開始！！1回服用量に注意！！</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>針先が、抗癌剤を含まない輸液に満たされた後、抜針する。</p> </div>	<p>経過時間</p> <p>0</p> <p>← (30分) ①</p> <p>90分</p> <p>1</p> <p>← 等速</p> <p>2</p> <p>← 30分</p> <p>②</p> <p>2時間</p> <p>3</p> <p>← 30分</p> <p>4</p> <p>← 30分</p> <p>5</p> <p>← 30分</p>	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p>注意</p> <p>ハーセプチンは、初回90分。初回投与時のインフュージョンリアクションが軽度であれば、次回より30分まで短縮可能</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>ハーセプチン 生食(250ml)</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">以下繰り上げ開始可</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>生食(50ml) フラッシュ用</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>デキサート(3.3mg/ml) 2A グラニセトロンバッグ(100ml)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>オキサリプラチン 5%ブドウ糖(250ml)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>曝露防止の観点より、あらかじめメインの輸液から側管用ルートのプライミングを行い、びん針の先に接続チューブをセットして準備する。</p> </div>