

レジメン名	トラスツズマブ+パクリタキセル(80)(継続)
がん種	胃癌

一般名	トラスツズマブ	投与量	8 mg/kg	単位	mg/kg	ハーセプチンは3週間隔の投与											
	(初回量)	8	mg/kg														
	トラスツズマブ (維持量)	6	mg/kg														
パクリタキセル	80	mg/m ²															
		day															
		week															
3週投与、1週休薬		1	8	15	22	29	36	43	50	57	64	71	78	85	92	99	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

治療内容(継続治療)		経過時間	
メイン	側管		
<p>ルート確保用輸液は、所要時間に合わせて適宜速度調節する。治療薬の投与中は中止可。残破棄可。</p> <p>ソリタT1(500ml) ハーセプチン投与中は止めておく</p> <p>ルートを確保</p> <p>最後は、針先が抗癌剤を含まない輸液に満たされた後、抜針する。</p>	<p>デキサート開始時 レスタミンコーワ 5錠内服</p> <p>デキサート(3.3mg/ml) 3A ガスター(20mg/2ml) 1A 生食(50ml)</p> <p>30分 あける ハーセプチン 生食(250ml)</p> <p>タキソール 生食(250ml)</p> <p>タキソールには、 0.22 μm以下の メンブランフィルターを使用</p> <p>タキソールには、 ビールで コップ1杯程度の アルコールが含まれる</p> <p>ハーセプチンの初回治療時の インフュージョンリアクションが 軽度であれば、投与時間を 30分まで短縮可</p>	<p>全開滴下</p> <p>(30分) ㊦</p> <p>1時間 ㊵</p>	
			0
			:30
			1
			:30
			2
			:30
		3	
		:30	
		4	
		:30	
		5	
		:30	
		6	
		:30	
		7	