レジメン名	ラムシルマブ＋nab-パクリタキセル
がん種	胃癌

一般名	投与量	単位
ラムシルマブ	8	mg/kg
nab-パクリタキセル	100	mg/㎡

4週で1コース

day 1 ・・・ 8 ・・・ 15 ・・・ 22 ・・・ 29 ・・・ 36 ・・・ 43 ・・・

1コース　2コース

day1・day15

メイン　側管

day1・day15
開始時
レスタミンコーワ
5錠内服

経過時間

0　:30　1　:30　2　:30　3　:30　4　:30

30分
あける

生食
(250ml)
ルート

30分 ⓥ
全開

全開滴下
全開フラッシュ
30分 ⓝ
1時間
等速フラッシュ

（省略可）
デキサート 2A
生食(50ml)

生食(50ml)

サイラムザ
生食(250ml)
0.2μmの
フィルターを使用

生食(50ml)

アブラキサン
生食(100ml)

生食(50ml)
フラッシュ用

ルート確保用輸液は、所要時間に合わせて適宜速度調節する。

サイラムザ初回投与時の忍容性が問題なければ2回目以降の投与時間を30分に短縮できる。

最後は、針先が抗癌剤を含まない輸液に満たされた後、抜針する。

day8

メイン　側管

生食(250ml)
ルート確保用

経過時間

0　:30　1　:30　2　:30　3　:30　4　:30　5　:30　6　:30

全開滴下
30分 ⓥ
全開

（省略可）
デキサート 2A
生食(50ml)

アブラキサン
生食(100ml)

生食(50ml)
フラッシュ用

アブラキサンの投与時は、メイン輸液を停止する。残破棄可。

アブラキサンは
フィルター禁止。
通過しません。

サイラムザとは
別のルートで投与。