レジメン名	ラムシルマブ＋パクリタキセル
がん種	胃癌

一般名	投与量	単位
ラムシルマブ	8	mg/kg
パクリタキセル	80	mg/㎡

4週で1コース

week 1 2 3 4 5 6 7 8

1コース　2コース

治療内容

メイン　側管

ルート確保用輸液は、所要時間に合わせて適宜速度調節する。
治療薬の投与中は中止可。
残破棄可。

生食(250ml)

30分あける

ルート確保

経過時間

0 :30 1 :30 2 :30 3 :30 4 :30 5 :30 6 :30 7

全開滴下

全開フラッシュ

30分 ⓝ

1時間

等速フラッシュ

ⓥ

1時間

開始時
レスタミンコーワ
5錠内服

デキサート(3.3mg/1ml) 3A
ガスター(20mg/2ml) 1A
生食(50ml)

生食(50ml)

サイラムザ
生食(250ml)
0.2μmのフィルターを使用

生食(50ml)

タキソール
生食(250ml)
0.2μmのフィルターを使用
サイラムザと同じルート使用可

サイラムザ初回投与時の忍容性が問題なければ2回目以降の投与時間を30分に短縮できる。

針先が、抗癌剤を含まない輸液に満たされた後、抜針する。

タキソールには、ビールでコップ1杯程度のアルコールが含まれる