

レジメン名  
がん種

# ゾルベツキシマブ+XELOX 胃癌

一般名	投与量	単位
ゾルベツキシマブ (初回量)	800	mg/m <sup>2</sup>
ゾルベツキシマブ (維持量)	600	mg/m <sup>2</sup>
オキサリプラチン	130	mg/m <sup>2</sup>
カペシタビン(内服)	2,000	mg/m <sup>2</sup> /日
	day	


  

3週ごと

2週服薬 → 休薬 → 2週服薬 → 休薬

1 ・・・ 8 ・・・ 15 ・・・ 22 ・・・ 29 ・・・ 36 ・・・

1コース                      2コース

		治療内容(初回)			
		メイン	側管		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">生食(500ml)</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; margin-bottom: 10px;">           ゼローダは朝夕食後に服用 day1夕から開始 !! 服用量を確認!!    </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">5%ブドウ糖(250ml)</div>	ルート確保	ルート確保	経過時間		
	0			30分	パロノセトロンバッグ(50ml) アロカリス 1V デキサート 2A ポララミン 1A
	:30			全開	生食(50ml) フラッシュ用
	1			80 mL/時 1時間	ビロイ 生食(1000ml) 要遮光
	:30			160 mL/時 1時間	<div style="text-align: center;">⚠</div> ビロイ投与中に、嘔吐/強い悪心が発現した場合は、投与を中断する。 ↓ 症状が回復したら中断時の半分の速度で再開する。 ↓ 症状の再発がなければ、30分後に中断時の投与速度へ戻して1時間投与。 以降は左図に従う。
	2			240 mL/時 1時間	
	:30			320 mL/時 最後まで	
	4			等速	
	:30			2時間	生食(50ml) フラッシュ用 オキサリプラチン 5%ブドウ糖(250ml)
	5				
:30					
6					
:30					
7					



一般名	投与量	単位
ゾルベツキシマブ (初回量)	800	mg/m <sup>2</sup>
ゾルベツキシマブ (維持量)	600	mg/m <sup>2</sup>
オキサリプラチン	130	mg/m <sup>2</sup>
カペシタビン(内服)	2,000	mg/m <sup>2</sup> /日
	day	

3週ごと

2週服薬 → 休薬 → 2週服薬 → 休薬

1コース      2コース

治療内容(2回目以降 : 前回のピロイ投与時に一時中断した場合)

	メイン	側管	経過時間	
生食(250ml)	ルート確保	全開	0	パロノセトロンバッグ(50ml) アロカリス 1V デキサート 2A
		60 mL/時 30分	:30	生食(50ml) フラッシュ用
		120 mL/時 30分	1	ピロイ 生食(500ml) 要遮光
		180 mL/時 30分	:30	<div style="border: 2px solid red; border-radius: 15px; padding: 10px;"> <p><b>!</b></p> <p>ピロイ投与中に、嘔吐/強い悪心が発現した場合は、投与を中断する。</p> <p>↓</p> <p>症状が回復したら中断時の半分の速度で再開する。</p> <p>↓</p> <p>症状の再発がなければ、30分後に中断時の投与速度へ戻して1時間投与。</p> <p>以降は左図に従う。</p> </div>
	240 mL/時 最後まで 累積 約2.75時間	2		
5%ブドウ糖(250ml)	ルート確保	等速	:30	生食(50ml) フラッシュ用
		2時間	3	オキサリプラチン 5%ブドウ糖(250ml)
			:30	<div style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 10px;"> <p>ゼローダは朝夕食後に服用 day1夕から開始 !! 服用量を確認!!</p>  </div>
			4	
			:30	
			5	
			:30	
			6	
			:30	
			7	