


レジメン名 ICd① (1クール目 イサツキシマブ+カルフィルゾミブ+デキサメタゾン) 1/2

一般名	投与量	単位					
イサツキシマブ	10 mg/kg		↓	↓	↓	↓	4週で1クール
カルフィルゾミブ	20 mg/m ²		↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓	Day23 は内服
デキサメタゾン	56 mg/m ²		↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓	
	20 mg/日		↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓	
	day		1 2 ... 8 9 ... 15 16 ... 22 23 ... 28				
			第1週	第2週	第3週	第4週	

1クール



ルート確保用輸液は、所要時間に合わせて適宜速度調節する。
カiproリス終了後、30分ほどかけて残り全量を投与する。

! サークリサの投与速度は、添付文書上の記載を基に体重80kgの患者の投与速度を計算して設定してある。

レジメン名 ICd①(1クール目 イサツキシマブ+カルフィルゾミブ+デキサメタゾン)

がん種 多発性骨髄腫

一般名	投与量	単位	4週で1クール	
イサツキシマブ	10 mg/kg		↓	↓
カルフィルゾミブ	20 mg/m ²		↓	↓
デキサメタゾン	56 mg/m ²		↓	↓
	20 mg/日		↓	↓
day	1	2	...	8
	9	...	15	16
	...	22	23	...
	28	Day23 は内服		
	第1週		第2週	
	第3週		第4週	
1クール				

