レジメン名	D-VMP(静注)①(1クール目)
がん種	多発性骨髄腫

6週間(42日間)で1クール

一般名	投与量	単位
ダラツムマブ	1800	mg/body
ボルテゾミブ(静注)	1.3	mg/㎡
メルファラン(内服)	9	mg/㎡
プレドニゾロン(内服)	60	mg/㎡
デキサメタゾン(内服)	20	mg/体

メルファラン(内服): day1～4に内服
プレドニゾロン(内服): day2～4に内服

day	1	4	・・・	8	11	・・・	15	・・・	22	25	・・・	29	32	・・・	36	・・・

1クール

Day1,8,22,29
ﾀﾞﾗｷｭｰﾛ+ﾎﾞﾙﾃﾞｿﾞﾐﾌﾞ

経過時間	メイン	側管

Day4,11,25,32
ﾎﾞﾙﾃﾞｿﾞﾐﾌﾞのみ

メイン	側管	経過時間

ダラキューロ投与の
1時間前に内服
カロナール(200) 4錠
オロパタジン(5) 1錠
デキサメタゾン 20mg

初回のみ:
モンテルカスト 1錠

皮下注(腹部)
ダラキューロ

ⓝ

ルート確保
全開滴下 ⓘ
全開滴下

ボルテゾミブ
生食(50ml)
ﾀﾞﾗｷｭｰﾛ終了後

生食(250ml)

生食(50ml)
フラッシュ用

生食(250ml)

ルート確保
全開滴下 ⓘ
全開滴下

ボルテゾミブ
生食(50ml)

生食(50ml)
フラッシュ用

【内服併用あり】
day1～4に
アルケラン
day2～4に
プレドニン
！服用量に注意！

レジメン名	D-VMP（静注）①（1クール目）
がん種	多発性骨髄腫

6週間（42日間）で1クール

一般名	投与量	単位
ダラツムマブ	1800	mg/body
ボルテゾミブ（静注）	1.3	mg/㎡
メルファラン（内服）	9	mg/㎡
プレドニゾロン（内服）	60	mg/㎡
デキサメタゾン（内服）	20	mg/体

メルファラン：day1～4に内服
プレドニゾロン：day2～4に内服

day	1	4	・・・	8	11	・・・	15	・・・	22	25	・・・	29	32	・・・	36	・・・

1クール

Day15,36
ﾀﾞﾗｷｭｰﾛのみ

経過時間	メイン	側管	経過時間
0			0
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6

ダラキューロ投与の
1時間前に内服
カロナール(200) 4錠
オロパタジン(5) 1錠
デキサメタゾン 20mg



皮下注（腹部）
ダラキューロ