


レジメン名	D-VMP(静注)②(2~9クール目)
がん種	多発性骨髄腫

一般名	投与量	単位		6週間(42日間)で1クール												
ダラツムマブ	1800 mg/body															
ボルテゾミブ(静注)	1.3 mg/m ²															
メルファラン(内服)	9 mg/m ²		day1~4に内服													
プレドニゾン(内服)	60 mg/m ²		day2~4に内服													
デキサメタゾン(内服)	20 mg/体															
day	1	4	...	8	11	...	15	...	22	25	...	29	32	...	36	...
1クール																



※ ダラキューロの皮下注射方法 ※

- 臍から左右に約7.5cmの腹部に約3~5分かけて15mLを皮下注射。
- 前回投与時と左右逆側に投与。
- ダラキューロ以外の薬剤を皮下注射する場合は、原則として腹部以外(上腕、大腿など)に投与すること。
- 投与中にInfusion reactionや痛みが発現した場合は、減速あるいは中断する。中断後の再開時は左右逆側の腹部に投与可能。
- シリンジへの採取から4時間以内に投与を終了する。
- 初回投与終了後、少なくとも6時間は定期的にバイタルチェック。

【内服併用あり】
 day1~4に
 アルケラン
 day2~4に
 プレドニン
 ! 服用量に注意!

