


レジメン名	VDC-mod
がん種	多発性骨髄腫

一般名	投与量	単位	
ボルテゾミブ	1.3	mg/m ²	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
シクロホスファミド(内服)	500	mg/m ²	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
デキサメタゾン(内服)	40	mg/日	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
	day		1 4 8 11 15 ... 22 25 29 32 36 ...
			第1週 第2週 第3週 第4週 第5週 第6週
			1コース 2コース

週2回投与を2週繰り返した後、1週休薬 3週で1コース

	治療内容		
	メイン	側管	
<p>ルート確保用輸液は、所要時間に合わせて適宜速度調節する。残破棄可</p> <p>ソリタT1(200ml)</p> <p>【内服併用あり】 day1,8,15に デキサメタゾン エンドキサン ! 服用量に注意!</p> <p>曝露防止の観点より、あらかじめメインの輸液から側管用ルートのプライミングを行い、びん針の先に接続チューブをセットして準備する。</p> 	<p>ルート確保</p> <p>適宜終了</p>	<p>経過時間</p> <p>0</p> <p>全開滴 ①</p> <p>全開滴下</p> <p>:30</p> <p>1</p> <p>:30</p> <p>2</p> <p>:30</p> <p>3</p> <p>:30</p> <p>4</p> <p>:30</p> <p>5</p> <p>:30</p> <p>6</p>	<p>ベルケイド 生食(50ml)</p> <p>生食(50ml) フラッシュ用</p>