


レジメン名	VMP
がん種	多発性骨髄腫

一般名	投与量	単位	ボルテゾミブは週2回ずつ2週投与し、1週休薬 これを2回繰り返し、6週で1コース															
ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
メルファラン (内服)	9 mg/m ²		↓	↓	↓	↓	day1~4内服						↓	↓	↓	↓		
プレドニゾン (内服)	60 mg/m ²		↓	↓	↓	↓	day1~4内服						↓	↓	↓	↓		
day			1	4	8	11	...	22	25	29	32	...	43	46	50	53		
			第1週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週								
1コース										2コース								

	治療内容		経過時間	
	メイン	側管		
ルート確保用輸液は、所要時間に合わせて適宜速度調節する。 残破棄可 ソリタT1(200ml)	ルート確保		0	全開滴 ① ベルケイド 生食(50ml)
	適宜終了		:30	全開滴下 生食(50ml) フラッシュ用
			1	
			:30	
曝露防止の観点より、あらかじめメインの輸液から側管用ルート のプライミングを行い、びん針の先に 接続チューブをセットして準備する。 			2	
			:30	
			3	
			:30	
		4		
		:30		