| レジメン名 | VMP（変法） |
|---|---|
| がん種 | 多発性骨髄腫 |

| 一般名 | 投与量 | 単位 |
|---|---|---|
| ボルテゾミブ | 1.3 | mg/㎡ |
| メルファラン（内服） | 9 | mg/㎡ |
| プレドニゾロン（内服） | 60 | mg/㎡ |

ボルテゾミブは2週投薬　1週休薬を2回繰り返す。 6週で1コース

day1～4内服

| day | 1 | 4 | 8 | 11 | ・・・ | 22 | 25 | 29 | 32 | ・・・ | 43 | 46 | 50 | 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 第1週 | | 第2週 | | 第3週 | 第4週 | | 第5週 | | 第6週 | 第7週 | | 第8週 | |

1コース　2コース

## 治療内容

| メイン | 経過時間 | 側管 |
|---|---|---|
| ソリタT1(200ml)<br>ルート確保<br>適宜終了 | 0 | 全開滴下 ⓘ<br>ボルテゾミブ<br>生食（50ml） |
| | :30 | 全開滴下<br>生食（50ml）<br>フラッシュ用 |
| | 1 | |
| | :30 | |
| | 2 | |
| | :30 | |
| | 3 | |
| | :30 | |
| | 4 | |