

レジメン名	パノピノスタット+ホルテゾミブ(1~8コース)
がん種	多発性骨髄腫

一般名	投与量	単位	2週繰り返した後、1週休薬 3週で1コース		
ホルテゾミブ	1.3 mg/m ²				
パノピノスタット(内服)	20 mg/日				
デキサメタゾン(内服)	20 mg/日				
	day		1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12 ... 15...21		
			第1週	第2週	3週
1コース					

	治療内容		
	メイン	側管	
<p>ルート確保用輸液は、所要時間に合わせて適宜速度調節する。残破棄可</p> <p>ソリタT1(200ml)</p> <p>【内服併用あり】 day1,3,5,8,10,12に パノピノスタット day1,2,4,5,8,9,11,12に デキサメタゾン ! 服用量に注意!</p> <p>曝露防止の観点より、あらかじめメインの輸液から側管用ルートのプライミングを行い、びん針の先に接続チューブをセットして準備する。</p>	<p>経過時間</p> <p>0</p> <p>← 全開滴下①</p> <p>← 全開滴下</p> <p>ルート確保</p> <p>適宜終了</p>	<p>ベルケイド 生食(50ml)</p> <p>生食(50ml) フラッシュ用</p>	
	1	:30	
	2	:30	
	3	:30	
	4	:30	
	5	:30	
	6	:30	