


レジメン名	パノピノスタット+ホルテゾミブ(9~16コース)
がん種	多発性骨髄腫

一般名	投与量	単位
ボルテゾミブ	1.3 mg/m <sup>2</sup>	
パノピノスタット(内服)	20 mg/日	
デキサメタゾン(内服)	20 mg/日	

2週繰り返した後、1週休薬 3週で1コース

day	1	2	3	4	5	...	8	9	10	11	12	...	15...	21	
	第1週						第2週						3週		

1コース

	治療内容	
	メイン	側管
<p>ルート確保用輸液は、所要時間に合わせて適宜速度調節する。残破棄可</p> <p><b>ソリタT1(200ml)</b></p> <p>【内服併用あり】 day1,3,5,8,10,12に パノピノスタット day1,2,8,9に デキサメタゾン ! 服用量に注意!</p> <p>曝露防止の観点より、あらかじめメインの輸液から側管用ルートのプライミングを行い、びん針の先に接続チューブをセットして準備する。</p> 	<p>経過時間</p> <p>0</p> <p>← 全開滴下 ①</p> <p>← 全開滴下</p> <p>ベルケイド 生食(50ml)</p> <p>生食(50ml) フラッシュ用</p>	
	<p>ルート確保</p> <p>適宜終了</p> <p>1</p> <p>:30</p>	
	2	:30
	3	:30
	4	:30
	5	:30
	6	:30