

レジメン名	パノビノスタットホルテゾミブ(9~16コース)(皮下注)
がん種	多発性骨髄腫

一般名	投与量	単位																													
ホルテゾミブ	1.3 mg/m ²		<div style="text-align: center;">2週繰り返した後、1週休薬 3週で1コース</div>																												
パノビノスタット(内服)	20 mg/日																														
デキサメタゾン(内服)	20 mg/日																														
	day		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>...</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>...</td><td>15...</td><td>21</td> </tr> <tr> <td colspan="6">第1週</td> <td colspan="6">第2週</td> <td colspan="2">3週</td> </tr> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">1コース</div>	1	2	3	4	5	...	8	9	10	11	12	...	15...	21	第1週						第2週						3週	
1	2	3	4	5	...	8	9	10	11	12	...	15...	21																		
第1週						第2週						3週																			

治療内容

【内服併用あり】
 day1,3,5,8,10,12に
 パノビノスタット
 day1,2,8,9に
 デキサメタゾン
 ! 服用量に注意!

皮下注射

ベルケイド

i