

1/2

Day1, 8, 15
ダラキューロ+カイクロリス

Day2, 9, 16
カイクロリスのみ

経過時間

メイン 側管

点滴開始時に内服
(day1, 8, 15)
点滴開始時に内服
カロナール(200) 4錠
オロパタジン(5) 1錠
初回のみ:
モンテルカスト 1錠

生食(250ml)

30分

30分

デキサート
生食(50ml)

30分

30分

カイクロリス
5%ブドウ糖(50ml)

30分

等速

5%ブドウ糖(100ml)
フラッシュ用

メイン
待機

30分

生食(250ml)

皮下注(腹部)
ダラキューロ
カイクロリスのフラッシュ後

※ ダラキューロの皮下注射方法 ※

- 臍から左右に約7.5cmの腹部に約3～5分かけて15mLを皮下注射。
- 前回投与時と左右逆側に投与。
- ダラキューロ以外の薬剤を皮下注射する場合は、原則として腹部以外(上腕、大腿など)に投与すること。
- 投与中にInfusion reactionや痛みが発現した場合は、減速あるいは中断する。中断後の再開時は左右逆側の腹部に投与可能。
- シリンジへの採取から4時間以内に投与を終了する。

投与部位と投与順番例

1 2
3 4

★ 要注意 ★

76歳以上の患者では、
デキサメタゾン減量のため、
投与日や投与量が変更の可能性あり。


2/24週で1クール

経過時間

Day22
ダラキューロのみ

メイン	側管
-----	----


経過時間




(day22)


ダラキューロ投与の
1時間前に内服

カロナール(200) 4錠

オロパタジン(5) 1錠 

デキサメタゾン 10錠





皮下注(腹部)
ダラキューロ

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6