レジメン名	DBLd(移植適応)①(1～2クール目)
がん種	多発性骨髄腫

一般名	投与量	単位
ダラツムマブ(皮下)	1800	mg/body
ボルテゾミブ(皮下)	1.3	mg/㎡
デキサメタゾン(内服)	40	mg/日
レナリドミド(内服)	25	mg/日

4週で1クール

day	1	2	3	4	5	・・・	8	9	10	11	12	・・・	15	・・・	22	・・・
	第1週						第2週						第3週		第4週	

1クール



※ ダラキューロの皮下注射方法 ※

- ●臍から左右に約7.5cmの腹部に約3～5分かけて15mLを皮下注射。
- ●前回投与時と左右逆側に投与。
- ●ダラキューロ以外の薬剤を皮ボルテゾミブぼ下注射する場合は、原則として腹部以外
  (上腕、大腿など)に投与すること。
- ●投与中にInfusion reactionや痛みが発現した場合は、減速あるいは中断する。中断後の再開時は左右逆側の腹部に投与可能。
- ●シリンジへの採取から4時間以内に投与を終了する。
- ●初回投与終了後、少なくとも6時間は定期的にバイタルチェック。

【内服併用あり】
day1～21に
レブラミド
！服用量に注意！

レジメン名	DBLd(移植適応)①(1～2クール目)
がん種	多発性骨髄腫

一般名	投与量	単位
ダラツムマブ(皮下)	1800	mg/body
ボルテゾミブ(皮下)	1.3	mg/㎡
デキサメタゾン(内服)	40	mg/日
レナリドミド(内服)	25	mg/日

4週で1クール

day	1	2	3	4	5	・・・	8	9	10	11	12	・・・	15	・・・	22	・・・
	第1週						第2週						第3週		第4週	

1クール

Day15, 22
ﾀﾞﾗｷｭｰﾛのみ

メイン	側管

経過時間 0 1 2 3 4 5 6 経過時間

ダラキューロ投与の
1時間前に内服
カロナール(200) 4錠
オロパタジン(5) 1錠
デキサメタゾン【指示量】



皮下注(腹部)
ダラキューロ

※ ダラキューロの皮下注射方法 ※

●臍から左右に約7.5cmの腹部に約3～5分かけて15mLを皮下注射。
●前回投与時と左右逆側に投与。
●ダラキューロ以外の薬剤を皮ボルテゾミブぽ下注射する場合は、原則として腹部以外
(上腕、大腿など)に投与すること。
●投与中にInfusion reactionや痛みが発現した場合は、減速あるいは中断する。中断後の再開時は左右逆側の腹部に投与可能。
●シリンジへの採取から4時間以内に投与を終了する。
●初回投与終了後、少なくとも6時間は定期的にバイタルチェック。

【内服併用あり】
day1～21に
レブラミド
！服用量に注意！

投与部位と投与順番例