


レジメン名	D(B)Ld(移植適応)③(7クール目以降)
がん種	多発性骨髄腫

一般名	投与量	単位	4週で1クール															
ダラツムマブ(皮下)	1800 mg/body		↓															
レナリドミド(内服)	10 mg/日		→															
day	1	2	3	4	5	...	8	9	10	11	12	...	15	...	22	...		
	第1週				第2週				第3週				第4週					
1クール																		

Day1
ダラキューロのみ

経過時間	メイン	側管	経過時間
------	-----	----	------

ダラキューロ投与の
1時間前に内服
カロナール(200) 4錠
オロパタジン(5) 1錠
デキサメタゾン【指示量】



皮下注(腹部)
ダラキューロ

※ ダラキューロの皮下注射方法 ※

- 臍から左右に約7.5cmの腹部に約3~5分かけて15mLを皮下注射。
- 前回投与時と左右逆側に投与。
- ダラキューロ以外の薬剤を皮ポルテゾミブぼ下注射する場合は、原則として腹部以外(上腕、大腿など)に投与すること。
- 投与中にInfusion reactionや痛みが発現した場合は、減速あるいは中断する。中断後の再開時は左右逆側の腹部に投与可能。
- シリンジへの採取から4時間以内に投与を終了する。
- 初回投与終了後、少なくとも6時間は定期的にバイタルチェック。

【内服併用あり】
連日
レブラミド
! 服用量に注意!

7クール目から
用法変更あり

投与部位と投与順番例

