

レジメン名	D(B)Ld(移植非適応)③(9クール目以降)
がん種	多発性骨髄腫

一般名	投与量	単位	4週で1クール													
ダラツムマブ(皮下)	1800 mg/body		↓ ↓ ↓ ↓													
デキサメタゾン(内服)	40 mg/日		↓ ↓ ↓ ↓													
レナリドミド(内服)	25 mg/日		↓ ↓ ↓ ↓													
day	1	2	3	4	5	...	8	9	10	11	12	...	15	...	22	...
	第1週				第2週				第3週				第4週			
————— 1クール —————																

経過時間




**Day1**  
ダラキューロのみ


メイン	側管
-----	----

経過時間

ダラキューロ投与の  
1時間前に内服

カロナール(200) 4錠  
オロパタジン(5) 1錠  
デキサメタゾン 20mg



皮下注(腹部)  
ダラキューロ

**※ ダラキューロの皮下注射方法 ※**

- 臍から左右に約7.5cmの腹部に約3~5分かけて15mLを皮下注射。
- 前回投与時と左右逆側に投与。
- ダラキューロ以外の薬剤を皮ボルテゾミブ皮下注射する場合は、原則として腹部以外(上腕、大腿など)に投与すること。
- 投与中にInfusion reactionや痛みが発現した場合は、減速あるいは中断する。中断後の再開時は左右逆側の腹部に投与可能。
- シリンジへの採取から4時間以内に投与を終了する。
- 初回投与終了後、少なくとも6時間は定期的にバイタルチェック。

【内服併用あり】  
day1~21に  
レブラミド  
! 服用量に注意!

9クール目から  
用法変更あり

**投与部位と投与順番例**

