レジメン名	Bev＋mFOLFOX6（外来）
がん種	大腸癌

一般名	投与量	単位
ベバシズマブ	5	mg/kg
レボホリナート	200	mg/㎡
オキサリプラチン	85	mg/㎡
5-FU（急速）	400	mg/㎡
5-FU（持続）	2,400	mg/㎡



治療内容

メイン　　側管

CVポートより投与する

経過時間

デキサート(3.3mg/ml) 2A
グラニセトロンバッグ(100ml)

30分

ベバシズマブBS
生食(100ml)

90分 ⓝ
↓
60分
↓
30分

生食(50ml) フラッシュ用

等速

オキサリプラチン
5%ブドウ糖(250ml)
(レボホリナートと同時開始)

ⓘ

2時間

レボホリナート
5%ブドウ糖（250ml）

2時間

15分 ⓘ

フルオロウラシル
生食（100ml）
エルプラット終了後

ⓘ

フルオロウラシル
生食（適宜）/規定薬液量

フルオロウラシル全開投与後
加圧式注入器で投与
（入院では1000mlの生食に
希釈して持続点滴する）

46時間

0 :30 1 :30 2 :30 3 :30 4 :30 5 :30

⚠ 注意

ベバシズマブの投与時間は、
初回90分。
投与に問題がなければ、
次回より60分→30分と
短縮可能