レジメン名	IRIS＋Bev(3W)
がん種	大腸癌

一般名	投与量	単位
ベバシズマブ	7.5	mg/kg
イリノテカン	150	mg/㎡
S-1（内服）	80	mg/㎡

3週で1クール

2週服薬 → 1週休薬 → 2週服薬

day	1	・・・	8	・・・	15	・・・	22	・・・	29	・・・

1クール　2クール

治療内容

ルート確保用輸液は、所要時間に合わせて適宜速度調節する。
治療薬の投与中は中止可。
残破棄可。

メイン

生食(500ml)

ルート確保

側管

経過時間

0　30分
アロキシバッグ
デキサート(3.3mg/ml) 2A

:30　ⓝ
90分(初回)
↓
60分
↓
30分
ベバシズマブBS
生食(100ml)

1

:30

2　等速
以下繰り上げ開始可
生食(50ml) フラッシュ用

:30　ⓘ
90分
（遮光）
イリノテカン
生食（500ml）

3

:30

4

:30

5

:30

6

:30

注意

ベバシズマブの投与時間は、
初回90分。
投与に問題がなければ、
次回より60分→30分と
短縮可能

エスワンは朝、夕食後に服用
（1回量40～60mg）
day1夕からday15朝まで服用
！！服用量を確認！！

針先が、抗癌剤を含まない輸液に満たされた後、抜針する。