| レジメン名 | XELIRI＋Bev |
|---|---|
| がん種 | 大腸癌 |

| 一般名 | 投与量 | 単位 |
|---|---|---|
| ベバシズマブ | 7.5 | mg/kg |
| イリノテカン | 200 | mg/㎡ |
| カペシタビン（内服） | 1,600 | mg/㎡ |

3週で1クール

2週服薬 → 1週休薬 → 2週服薬

| day | 1 | ・・・ | 8 | ・・・ | 15 | ・・・ | 22 | ・・・ | 29 | ・・・ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1クール　2クール

## 治療内容

ルート確保用輸液は、所要時間に合わせて適宜速度調節する。
治療薬の投与中は中止可。
残破棄可。

**メイン**

生食(500ml)

ルート確保

**側管**

経過時間

0：30分
アロキシバッグ
デキサート(3.3mg/ml) 2A

:30：ⓝ 90分(初回) ↓ 60分 ↓ 30分
ベバシズマブBS
生食(100ml)

2：等速
以下繰り上げ開始可
生食(50ml) フラッシュ用

:30：ⓘ 90分（遮光）
イリノテカン
生食（500ml）

### 注意

ベバシズマブの投与時間は、
初回90分。
投与に問題がなければ、
次回より60分→30分と
短縮可能

ゼローダは朝夕食後に服用
day1夕から開始
！！服用量を確認！！

針先が、抗癌剤を含まない輸液に満たされた後、抜針する。