レジメン名	アフリベルセプト＋FOLFIRI
がん種	大腸癌

一般名	投与量	単位
アフリベルセプト	4	mg/kg
レボホリナート	200	mg/㎡
イリノテカン	150	mg/㎡
5－FU（急速）	400	mg/㎡
5－FU（持続）	2,400	mg/㎡

2週ごとに投与

(46hrs)

day	1	2	3	・・・	8	・・・	15	16	17	・・・	22	・・・	29	30

2週　2週

治療内容

メイン　側管

CVポートより投与する

経過時間

0　:30　1　:30　2　:30　3　:30　4　:30　5　:30

生食（250ml）

ルート確保

ⓝ 1時間

ザルトラップ
生食（100ml）
0.2μmのインラインフィルターを使用

約30分

生食（50ml）
等速フラッシュ

デキサート（3.3mg/1ml）　2A
パロノセトロンバッグ（50ml）

30分

イリノテカン
5%ブドウ糖（250ml）
（レボホリナートと同時開始）

ⓘ 2時間（遮光）

2時間

レボホリナート
5%ブドウ糖（250ml）

15分 ⓘ

フルオロウラシル
生食（100ml）
イリノテカン終了後

ⓘ

フルオロウラシル
生食（適宜）/規定液量

フルオロウラシル全開投与後
加圧式注入器で投与
（入院では1000mlの生食に希釈して持続点滴する）

46時間