


レジメン名	パニツムマブ
がん種	大腸癌

一般名	投与量	単位	
パニツムマブ	6 mg/kg	day	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">2週ごとに投与</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> ↓ ↓ ↓ ↓ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 1 ... 8 ... 15 ... 22 ... 29 ... 36 ... 43 ... </div>

	治療内容		経過時間		
	メイン	側管			
<p>ルート確保用輸液は、所要時間に合わせて適宜速度調節する。治療薬の投与中は中止可。残破棄可。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>生食(250ml)</p> </div> <div style="border: 2px solid red; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p>ベクティビックスの投与終了後、1時間は症状観察を行う</p>  <p>問題がなければメインルートの抜去可</p> </div>	ルート確保	① 1時間	0 :30	<p>ベクティビックス 生食(100ml) 0.2μのメンブレンフィルターを</p>	
			約30分	1 :30	<p>生食(50ml) 等速フラッシュ</p>
				2 :30	
				3 :30	
				4 :30	
				5 :30	
				6 :30	
			7		