レジメン名	パニツムマブ＋mFOLFOX6
がん種	大腸癌

一般名	投与量	単位
パニツムマブ	6	mg/kg
レボホリナート	200	mg/㎡
オキサリプラチン	85	mg/㎡
5－FU（急速）	400	mg/㎡
5－FU（持続）	2,400	mg/㎡

2週ごとに投与

(46hrs)

day: 1 2 3 ・・・ 8 ・・・ 15 16 17 ・・・ 22 ・・・ 29 30

2週　2週

治療内容

CVポートより投与する

経過時間: 0 :30 1 :30 2 :30 3 :30 4 :30 5 :30

メイン

生食(250ml)

ルート確保

30分

デキサート(3.3mg/1ml)　2A
パロノセトロンバッグ(50ml)

オキサリプラチン
5%ブドウ糖(250ml)
(レボホリナートと同時開始)

ⓘ 2時間

15分 ⓘ

フルオロウラシル
生食（100ml）
オキサリプラチン終了後

ⓘ 46時間

フルオロウラシル
生食（適宜）/規定薬液量

フルオロウラシル全開投与後
加圧式注入器で投与
(入院では1000mlの生食に
希釈して持続点滴する)

側管

ⓝ 1時間

ベクティビックス
生食（100ml）
0.2μmのメンブレンフィルターを使用

約30分

生食(50ml)
等速フラッシュ

2時間

レボホリナート
5%ブドウ糖（250ml）