レジメン名	EC＋mFOLFOX6
がん種	大腸癌

一般名	投与量	単位
セツキシマブ	500	mg/㎡
レボホリナート	200	mg/㎡
オキサリプラチン	85	mg/㎡
5-FU（急速）	400	mg/㎡
5-FU（持続）	2,400	mg/㎡
エンコラフェニブ（内服）	300	mg/体



治療内容

メイン　　側管

CVポートより投与する

経過時間

0　:30　1　:30　2　:30　3　:30　4　:30　5　:30　6

生食(500ml)

ルート確保

30分

パロノセトロンバッグ(50ml)
デキサート　2A
ポララミン　1A

アービタックス
生食（500ml）

ⓝ

2時間

生食(50ml)　フラッシュ用
残破棄可

等速

オキサリプラチン
5%ブドウ糖(250ml)
(レボホリナートと同時開始)

ⓘ

2時間

レボホリナート
5%ブドウ糖（250ml）

2時間

15分 ⓘ

フルオロウラシル
生食（100ml）
オキサリプラチン終了後

ⓘ

フルオロウラシル
生食（適宜）/規定薬液量

フルオロウラシル全開投与後
加圧式注入器で投与
（入院では1000mlの生食に
希釈して持続点滴する）

46時間

【内服併用あり】
ビラフトビ カプセル
（連日服用）

★服用量を★
★要確認★