

レジメン名	Per+Tras+エリブリン(皮下)
がん種	乳癌

一般名	投与量	単位	
ペルツズマブ	(初回量)	1200 mg/body	↓
	(維持量)	600 mg/body	
トラスツズマブ	600 mg/body	↓	↓
エリブリン	1.4 mg/m ²	↓	

3週で1クール

day 1 ... 8 ... 21 22 ... 29 ... 42

1クール 2クール

day1			day8		
メイン	経過時間	側管	メイン	経過時間	側管
生食 (100ml) ルート 確保	0	30分	生食 (100ml) ルート 確保	0	30分
	:30	全開 ①	デキサート 2A 生食(50ml)	:30	全開 ①
	1	全開滴下	ハラヴェン 生食(50ml)	1	全開滴下
	:30	皮下注(大腿部) フェスゴ	生食(50ml) フラッシュ用	:30	デキサート 2A 生食(50ml)
	2			2	ハラヴェン 生食(50ml)
	:30			:30	生食(50ml) フラッシュ用
	3			3	
	:30			:30	
4			4		
:30			:30		
5			5		
:30			:30		
6			6		
:30			:30		
7			7		

30分
症状観察

初回時投与時の認容性に
問題が無ければ、2回目以降は
フェスゴ後の観察時間を
15分まで短縮可。