


レジメン名	トラスツズマブ デルクステカン
がん種	乳癌



	治療内容		経過時間		
	メイン	側管			
<p>ルート確保用輸液は、所要時間に合わせて適宜速度調節する。治療薬の投与中は中止可。残破棄可。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">5%ブドウ糖(250ml)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0; text-align: center;">ルート確保</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>針先が、抗癌剤を含まない輸液に満たされた後、抜針する。</p> </div>	0	30分	0	パロノセトロン(0.75mg/50ml) アロカリス(235mg/10ml) 1V デキサート(3.3mg/1ml) 2A	
	:30	全開フラッシュ	1	(30分) ⓘ	5%ブドウ糖(100ml) 残破棄可
	1	90分 (遮光)	2	90分 (遮光)	エンハーツ 5%ブドウ糖(100ml) 0.2μmの インラインフィルターを使用
	:30	等速	3	:30	5%ブドウ糖(100ml) 等速フラッシュ用 残破棄可
	2		4	:30	★注意★ エンハーツは 生食と混合不可
	:30		5	:30	
	3		6	:30	
4		7	:30		