レジメン名	トラスツズマブ＋TC
がん種	乳癌

一般名		投与量	単位
トラスツズマブ	（初回量）	8	mg/kg
	（維持量）	6	mg/kg
ドセタキセル		75	mg/㎡
シクロホスファミド		600	mg/㎡

3週間隔

day	1	・・・	8	・・・	15	・・・	22	・・・	29	・・・	36	・・・	43	・・・

1コース　2コース

治療内容

メイン　側管

ルート確保用輸液は、所要時間に合わせて適宜速度調節する。
治療薬の投与中は中止可。
残破棄可。

初回時投与時の認容性に問題が無ければ、2回目以降はハーセプチンの**投与時間と観察時間を30分まで短縮可。**

経過時間

0　:30　1　:30　2　:30　3　:30　4　:30　5　:30　6　:30

生食（250ml）

ルート確保

15分　デキサート　2A　生食（50ml）

(30分) ⓝ　ハーセプチン　生食（250ml）

90分

ⓥ　60分　ドセタキセル　生食（250ml）

ⓘ　30分　エンドキサン　生食（100ml）

15分　生食（50ml）

最後は、針先が抗癌剤を含まない輸液に満たされた後、抜針する。

ドセタキセルの専用溶解液には少量のアルコールが含まれます。
アルコールに過敏な方の場合は特別な調製方法が必要となります。