


レジメン名  
がん種

# ベバシズマブ(3W) 脳腫瘍

|        |      |              |                |                    |
|--------|------|--------------|----------------|--------------------|
| 一般名    | 投与量  | 単位           | 3週ごと           |                    |
| ベバシズマブ | 15.0 | mg/kg<br>day | 1 2 3 4 ... 21 | 22 23 24 25 ... 42 |
|        |      |              | 1コース           |                    |
|        |      |              | 2コース           |                    |

|  |              | 治療内容  |                                      |  |  |
|--|--------------|---|--------------------------------------|--|--|
|  |              | メイン   | 側管                                   |  |  |
| <p>ルート確保用輸液は、所要時間に合わせて適宜速度調節する。</p> <p><b>生食(100ml)</b></p> <p>曝露防止の観点より、あらかじめメインの輸液から側管用ルートのプライミングを行い、びん針の先に接続チューブをセットして準備する。</p>  | <p>ルート確保</p> | <p>経過時間</p> <p>0</p> <p>90分 ①</p> <p>↓</p> <p>60分</p> <p>↓</p> <p>30分</p> | <p><b>アバステン</b></p> <p>生食(100ml)</p> |  |  |
|  |              | <p>等速</p>   | <p>生食(50ml)</p> <p>等速フラッシュ</p>       |  |  |
|  |              |   |                                      |  |  |
|  |              |   |                                      |  |  |
|  |              |   |                                      |  |  |
|  |              |   |                                      |  |  |

**注意**

アバステンは、初回 90分。投与に問題がなければ、次回より60分→30分と短縮可能

針先が、抗癌剤を含まない輸液に満たされた後、抜針する。

