

レジメン名
がん種

Bev+TMZ+RT 脳腫瘍

一般名	投与量	単位	
ベバシズマブ	10.0	mg/kg	<div style="text-align: center;"> <p>2週ごと 計4回 手術創の治癒後に開始</p> <p>1 ... 15 ... 29 ... 43 ... 70</p> <p>10週</p> </div>
放射線照射	2.0	Gy/日	
テモゾロミド(内服)	75	mg/m ² /日	
			day

治療内容		経過時間	
メイン	側管		
<p>ルート確保用輸液は、所要時間に合わせて適宜速度調節する。</p> <p style="text-align: center;">生食(100ml)</p> <p>曝露防止の観点より、あらかじめメインの輸液から側管用ルートのプライミングを行い、びん針の先に接続チューブをセットして準備する。</p> <p>テモダールは1日1回服用！！服用量を確認！！</p>	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>⚠ 注意</p> <p>アバスチンは、初回 90分。投与に問題がなければ、次回より60分→30分と短縮可能</p> </div> <p style="text-align: center;">アバスチン 生食(100ml)</p> <p style="text-align: center;">90分 ↓ 60分 ↓ 30分</p> <p style="text-align: center;">等速</p> <p style="text-align: center;">生食(50ml) 等速フラッシュ</p> <p>針先が、抗癌剤を含まない輸液に満たされた後、抜針する。</p>	0	
		ルート確保	
		1	
		:30	
		2	
		:30	
		3	
		:30	
		4	
		:30	
		5	
		:30	