

レジメン名	アザシチジン(点滴静注)
がん種	骨髄異形成症候群、急性骨髄性白血病

一般名 投与量 単位

7日間投与、28日で1コース

アザシチジン 75 mg/m² day

投与の手順

◎出血傾向などの理由で皮下投与が困難な場合は点滴静注とする。

	治療内容		
	メイン	側管	
<p>ルート確保用輸液は、所要時間に合わせて適宜速度調節する。残破棄可</p> <p style="text-align: center;">生食(250ml)</p> <div style="border: 1px solid red; border-radius: 15px; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>アザシチジンは調製から1時間以内に投与を終える。</p> </div>	<p>ルート確保</p>	<p>経過時間</p> <p>0 ← 30分</p> <p>:30 ← 10分 ㊦</p> <p>1 ← 約10分</p> <p>:30</p> <p>2</p> <p>:30</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ナゼア 1A</p> <p>デキサート 3A</p> <p>生食(100ml)</p> <p style="border: 2px solid blue;">アザシチジン</p> <p>生食(50ml)</p> <p>生食(50ml)</p> <p style="color: red;">等速フラッシュ</p> </div>