

レジメン名	GEM+CBDCA
がん種	尿路上皮癌

一般名	投与量	単位	
ゲムシタピン	1000 mg/m ²		↓ ↓ ↓ ↓
カルボプラチン	5 AUC		
			3~4週で1コース
day			1 ... 8 ... 15 ... 22 ... 29 ... 36 ...
			1クール 2クール

		治療内容	
		メイン	側管
ソリタT1 (200ml)	ルート確保	経過時間	
		0	30分
		0:20	全開滴下
		1	30分 ⓘ
		1:30	1時間 ⓘ
		2	
		2:30	
		3	
		【day1】	パロノセトロン バッグ アロカリス デキサート 2A
		【day8】	デキサート 2A 生食(100ml)
			生食(50ml) 【day1のみ】
			ジェムザール 生食(100ml)
			【day1のみ】 カルボプラチン 生食(250ml)

ジェムザールは溶解後のpHが約3と酸性寄りであり、患者様が血管刺激症状を訴えられることがあります。以下のような予防・緩和策が考えられます。

1. 穿刺にはなるべく太い血管を選ぶ
2. 穿刺部位より上流側を温めて、血管を拡張させる
3. ジェムザールの投与中はソリタの投与速度を速めて血管内のジェムザールが薄まるようにする



		5	
		:30	
		6	
		:30	
		7	