


レジメン名	GEM+放射線
がん種	尿路上皮癌



放射線治療は、放射線治療医と主治医が相談して決定する。

		治療内容		
		メイン	側管	
<p>ルート確保用輸液は、所要時間に合わせて適宜速度調節する。治療薬の投与中は中止可。残破棄可。</p> <p>ソリタT1(200ml)</p> <p>針先が、抗癌剤を含まない輸液に満たされた後、抜針する。</p>	<p>ルート確保</p>	<p>経過時間</p> <p>0 ← 30分</p>	<p>(省略可)</p> <p>デキサート(3.3mg) 1A 生食(50ml)</p>	
		<p>①</p> <p>30分</p>	<p>ジェムザール 生食(100ml)</p>	
		1		<p>放射線照射の2~4時間前を目安にジェムザールを投与</p>
		:30		
		2		
		:30		
		3		
		:30		
		5		
		:30		
		6		
		:30		
		7		

ジェムザールは溶解後のpHが約3と酸性寄りであり、患者様が血管刺激症状を訴えられることがあります。以下のような予防・緩和策が考えられます。

1. 穿刺にはなるべく太い血管を選ぶ
2. 穿刺部位より上流側を温めて、血管を拡張させる
3. ジェムザールの投与中はソリタの投与速度を速めて血管内のジェムザールが薄まるようにする

