レジメン名	DED
がん種	前立腺癌

	一般名	投与量	単位
	ドセタキセル	25	mg/㎡
内服	エストラムスチン	560	mg/日
内服	デキサメタゾン	1	mg/日

ドセタキセルは2週投薬、1週休薬　3週で1コース

連日服用

day	1	2	3	・・・	8	9	10	・・・	15	・・・	21	22	23	24

1コース　2コース

治療内容

ルート確保用輸液は、所要時間に合わせて適宜速度調節する。
治療薬の投与中は中止可。
残破棄可。

メイン	経過時間	側管
ソリタT1（200ml） ルート確保	0	点滴静注：デキサート（3.3mg/ml）　2A 生食（50ml）
	:30	Ⓥ ドセタキセル 生食（250ml）
	1	1時間
	:30	
	2	
	:30	
	3	
	:30	
	4	
	:30	
	5	
	:30	
	6	
	:30	
	7	

針先が、抗癌剤を含まない輸液に満たされた後、抜針する。

エストラサイトは、ドセタキセルの投与日から3日間服用する。
乳製品等に含まれるカルシウムとの相互作用により効果が減弱するので、食事とは2時間程度の間隔を明け、空腹時に服用するのが望ましい。

ドセタキセルの専用溶解液には少量のアルコールが含まれます。
アルコールに過敏な方の場合は特別な調製方法が必要となります。