


レジメン名	ドセタキセル
がん種	前立腺癌

一般名	投与量	単位	
ドセタキセル	70	mg/m <sup>2</sup>	↓ 3週間隔 ↓
プレドニゾン	10	mg/日	

**連日朝・昼に服用**

day 1 ... 8 ... 15 ... 22 ... 29 ... 36 ... 43 ...

		治療内容			
		メイン	側管		
<p>ルート確保用輸液は、所要時間に合わせて適宜速度調節する。治療薬の投与中は中止可。残破棄可。</p> <p><b>ソリタT1 (200ml)</b></p> <p>針先が、抗癌剤を含まない輸液に満たされた後、抜針する。</p> 	<p>ルート確保</p>	<p>ドセタキセル 生食 (250ml)</p> <p>2時間</p> <p>ドセタキセルの専用溶解液には少量のアルコールが含まれます。アルコールに過敏な方の場合は特別な調製方法が必要となります。</p> 			
		<p>曝露防止の観点より、あらかじめメインの輸液から側管用ルートのプライミングを行い、びん針の先に接続チューブをセットして準備する。</p> 	経過時間		
			0		
			:30		
			1		
			:30		
			2		
:30					
3					
:30					
4					
:30					
5					
:30					
6					
:30					
7					