| レジメン名 | wPAC+Bev |
|---|---|
| がん種 | 卵巣癌 |

| 一般名 | 投与量 | 単位 |
|---|---|---|
| パクリタキセル | 80 | mg/㎡ |
| ベバシズマブ | 10 | mg/kg |

2週で1コース

day 1 ・・・・ 7 8 ・・・・ 14 15 ・・・・

1コース

## 治療内容

### メイン

ルート確保用輸液は、所要時間に合わせて適宜速度調節する。
治療薬の投与中は中止可。
残破棄可。

生食(250ml)

ルート確保

タキソールには、ビールでコップ1杯程度のアルコールが含まれる

投与終了後、異常がないことを確認し、抜去する。

### 側管

経過時間

開始時
レスタミンコーワ
5錠内服

0 全開滴下

デキサート(3.3mg/ml) 3A
ガスター(20mg/2ml) 1A
生食(50ml)

30分あける

:30

1 ⓥ 1時間

タキソール
生食(250ml)

タキソールには、
0.22μm以下の
メンブランフィルターを使用

:30

2 ⓝ 90分→60分→30分

アバスチン
生食(100ml)
初回治療時の認容性が良好であれば次回より、60分→30分と短縮可

:30

3 :30 等速フラッシュ

生食(50ml)
残破棄可

4 :30

アバスチンの投与時間が30分となる時点から、外来治療可

5 :30

6 :30

7