レジメン名	Bev＋TC
がん種	卵巣癌、子宮頸癌

一般名	投与量	単位
ベバシズマブ	15	mg/kg
パクリタキセル	175	mg/㎡
カルボプラチン	6	AUC

3週間隔で6回まで

day 1 ・・・ 8 ・・・ 15 ・・・ 22 ・・・ 29 ・・・ 36 ・・・ 43 ・・・

1クール　2クール　3クール

治療内容

メイン	経過時間	側管	
			開始時 レスタミンコーワ 5錠内服
	0	全開滴下	デキサート 5A ガスター 1A 生食（50ml）
生食(500ml)	:30	30分	パロノセトロンバッグ アロカリス
	1	ⓥ	パクリタキセル 生食（500ml）
	:30		
	2	3時間	パクリタキセルには、ビールで中瓶1本程度のアルコールが含まれる
	:30		
ルート確保	3		
	:30		
	4	ⓘ 1時間	カルボプラチン 生食（250ml）
	:30		
	5	ⓝ 90分 ↓ 60分 ↓ 30分	アバスチン 生食(100ml)
	:30		
	6	等速	生食(50ml) 等速フラッシュ
	:30		

注意

アバスチンは、初回 90分。
投与に問題がなければ、
次回より60分→30分と
短縮可能