

レジメン名	weekly TC
がん種	卵巣癌、卵管癌、腹膜癌

一般名	投与量	単位	
パクリタキセル	60	mg/m ²	
カルボプラチン	2	AUC	
			1週間間隔で18回投与
day			1 ... 8 ... 15 ... 120

		治療内容	
		メイン	側管
<p>ルート確保用輸液は、所要時間に合わせて適宜速度調節する。治療薬の投与中は中止可。残破棄可。</p> <p>ソリタT1(200ml)</p> <p>心機能に注意が必要な患者様の場合、タキソール、パラプラチンの投与中はECGモニタリングが必要になります。</p> <p>針先が、抗癌剤を含まない輸液に満たされた後、抜針する。</p>	<p>ルート確保</p>	<p>経過時間</p> <p>0 ← 全開滴下</p> <p>:30 ← 30分</p> <p>1 ← 1時間 (V)</p> <p>:30 ← 30分 (i)</p> <p>2</p> <p>:30</p> <p>3</p> <p>:30</p> <p>4</p> <p>:30</p> <p>5</p> <p>:30</p> <p>6</p> <p>:30</p>	<p>開始時 レスタミンコーワ 5錠内服</p> <p>デキサート(3.3mg/ml) 2A ガスター(20mg/2ml) 1A 生食(50ml)</p> <p>グラニセロンバッグ</p> <p>タキソール 生食(250ml)</p> <p>タキソールには、0.22 μm以下のメンブランフィルターを使用</p> <p>パラプラチン 5%ブドウ糖(250ml)</p> <p>タキソールには、ビールでコップ1杯程度のアルコールが含まれる</p>