




レジメン名	GEM+CBDCA
がん種	卵巣癌



		治療内容	
		メイン	側管
<p>ルート確保用輸液は、所要時間に合わせて適宜速度調節する。治療薬の投与中は中止可。残破棄可。</p> <p>ソリタT1(200ml)</p> <p>針先が、抗癌剤を含まない輸液に満たされた後、抜針する。</p> 	<p>ルート確保</p>	<p>経過時間</p> <p>0 ← 30分</p>	<p>パラプラチンAUC≥4では、day1~3にイメンドの併用を推奨</p> <p>デキサート(3.3mg/ml) 3A グラニセトンバッグ(100ml)</p>
		<p>← 30分 ⓘ</p>	<p>ジェムザール生食(100ml)</p>
		<p>← 1時間 ⓘ</p>	<p>パラプラチン生食(250ml) day1のみ</p>
		<p>2</p>	
		<p>← 30分</p>	
		<p>3</p>	
<p>ジェムザールは溶解後のpHが約3と酸性寄りであり、患者様が血管刺激症状を訴えられることがあります。以下のような予防・緩和策が考えられます。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 穿刺にはなるべく太い血管を選ぶ 2. 穿刺部位より上流側を温めて、血管を拡張させる 3. ジェムザールの投与中はソリタの投与速度を速めて血管内のジェムザールが薄まるようにする 			
		5	
		← 30分	
		6	