


レジメン名	GEM+エルロチニブ
がん種	膵癌



		治療内容	
		メイン	側管
<p>ルート確保用輸液は、所要時間に合わせて適宜速度調節する。治療薬の投与中は中止可。残破棄可。</p> <p>ソリタT1(200ml)</p> <p>針先が、抗癌剤を含まない輸液に満たされた後、抜針する。</p>	<p>ルート確保</p>	<p>経過時間</p> <p>0 ← 30分</p>	<p>デキサート 2A 生食(100ml)</p>
		<p>①</p> <p>← 30分</p>	<p>ジェムザール 生食(100ml)</p>
<p>ジェムザールは溶解後のpHが約3と酸性寄りであり、患者様が血管刺激症状を訴えられることがあります。以下のような予防・緩和策が考えられます。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 穿刺にはなるべく太い血管を選ぶ 2. 穿刺部位より上流側を温めて、血管を拡張させる 3. ジェムザールの投与中はソリタの投与速度を速めて血管内のジェムザールが薄まるようにする 			
<p>タルセバは毎日服用 用量注意</p>		<p>4</p> <p>:30</p> <p>5</p> <p>:30</p> <p>6</p> <p>:30</p> <p>7</p>	