レジメン名	アブラキサン+GEM
がん種	膵癌

一般名	投与量	単位
パクリタキセル	125	mg/㎡
ゲムシタビン	1,000	mg/㎡

3週投薬、1週休薬　4週で1クール

day 1 ・・・ 8 ・・・ 15 ・・・ 22 ・・・ 29 ・・・ 36 ・・・ 43 ・・・

1クール　2クール

治療内容

メイン　側管

ルート確保用輸液は、所要時間に合わせて適宜速度調節する。
治療薬の投与中は中止可。
残破棄可。

ソリタT1（200ml）
アブラキサン投与中は止めておく

ルート確保

針先が、抗癌剤を含まない輸液に満たされた後、抜針する。

経過時間

0　30分　グラニセトロンバッグ デキサート　2A

:30　30分 ⓥ　アブラキサン 生食（100ml）

1　10分　生食（50ml）

:30　30分 ⓘ　ジェムザール 生食（100ml）

2　:30

3　:30

6　:30

アブラキサンは フィルター禁止 通過しません

ジェムザールは溶解後のpHが約 3 と酸性寄りであり、患者様が血管刺激症状を訴えられることがあります。以下のような予防・緩和策が考えられます。

1. 穿刺にはなるべく太い血管を選ぶ
2. 穿刺部位より上流側を温めて、血管を拡張させる
3. ジェムザールの投与中はソリタの投与速度を速めて血管内のジェムザールが薄まるようにする