レジメン名　**ニボルマブ＋イピリムマブ（悪性黒色腫）**

がん種　**悪性黒色腫**

一般名	投与量	単位
ニボルマブ	80	mg/body
イピリムマブ	3	mg/kg
		day

3週ごと

4コース投与後、ニボルマブ単独での維持療法に移行する。

1	2	3	4	・・・	21	22	23	24	25	・・・	42

1コース　2コース

治療内容

ルート確保用輸液は、所要時間に合わせて適宜速度調節する。

オプジーボ投与終了後、ヤーボイ投与開始まで30分以上間隔をあける。

経過時間	メイン	側管
0	生食（100ml） ルート確保	30分 ⓝ オプジーボ 生食（100ml）
:30		30分 生食（100ml）
1		90分 ⓝ ヤーボイ 生食（250ml） ※最終濃度1mg/mLに調製
:30		
2		
:30		
3		
:30		
4		
:30		
5		
:30		

針先が、抗癌剤を含まない輸液に満たされた後、抜針する。

・オプジーボには、0.2μmまたは0.22μmのインラインフィルターを使用する。

・ヤーボイには、0.2～1.2μmのインラインフィルターを使用する。

曝露防止の観点より、あらかじめメインの輸液から側管用ルートのプライミングを行い、びん針の先に接続チューブをセットして準備する。